

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

BULLETIN DESTINÉ AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS ET DU RAZES

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes, les GVA, les CIVAM)
et les coopératives

N° 1 du 15 AVRIL 1987

POIS PROTEAGINEUX

Dès le début floraison le risque BOTRYTIS sera présent, la maladie ne doit pas s'installer. Il convient de protéger préventivement les cultures.

L'ANTHRACNOSE est parfois encore virulente.

Le MILDIOU est présent dans la plupart des parcelles.

Pour cet ensemble de maladies

TRAITEZ AU PLUS TARD DEBUT FLORAISON AVEC

PELTAR poudre 4 kg/ha ou PELTAR flo 6 à 6,5 l/ha
PREFONGIL 2 l/ha

Des pucerons ont déjà été observés.

Le risque bruche (pois troués) intervient à la pleine floraison.

En cas de parcelles très avancées vous pouvez rajouter un insecticide polyvalent
PUCERON - BRUCHE

SUMICIDIN 0,5 L
SERK 1,5 L

Néanmoins en cas de forte attaque ponctuelle de pucerons le Pirimor reste le plus adapté.

CEREALES

Blés tendres Blés durs

traces d'oidium et de septoriose à la base des plantes

Orges

oidium présent mais en régression

AUCUNE INTERVENTION NE SE JUSTIFIE ACTUELLEMENT

(Tirage du 15 AVRIL 1987 - 1600 exemplaires)

(c) Bulletin technique des avertissements agricoles - Montpellier 1987 - SPV.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42

